© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Litteratur:

Kobelt, Dr. W., Iconographie der Land- und Süsswasser-Mollusken mit vorzüglicher Berücksichtigung der europaeischen noch nicht abgebildeten Arten von E. A. Rossmaessler. Neue Folge, zwölfter Band, erste und zweite Lieferung. (Ausgegeben Mitte Juni 1905).

Enthält mit Ausnahme einiger Buliminus ausschliesslich Pomatia (von denen viele gleichzeitig im Martini-Chemnitz zur Abbildung kommen, oder schon gekommen sind). — Namentlich sind es die Gruppen von Helix figulina und vulgaris. — Zum erstenmal abgebildet sind: Helix sieversi no. 1969; — Helix cavata tripolitana no. 1970; — Buliminus prusanus Naegele no. 1971; — Bul. albocostatus orloffensis no. 1971; — Pomatia secernenda montenegrina Wohlb. no. 1973; — Helix grothei no. 1974; — Buliminus sylvestris Rosen no. 1975; — Bul. larvatus Ancey no. 1976.

Tesch. J. J., Vorläufige Mitteilung über die Thecosomata und Gymnosomata der Siboga Expedition. — In: Tijdschr. nederl. Dierk Vereen. II. vol. 8 p. 111—118.

Vorläufige Beschreibungen von Peraclis rissoides p. 111; — P. moluccensis p. 112; — Cymbulia sibogae p. 113; — Cymbuliopsis intermedia p. 113; — Pneumodeima heterocotylum p. 114; — Pn. pygmaeum p. 115; — Clionopsis microcephalus p. 115; — Clione punctata p. 116; — Paraclione pelseneeri n. gen. et spec. p. 117; — Sämtliche Arten aus dem mittleren Indischen Ozean, bestimmte Fundorte nicht angegeben. — Separata anscheinend schon 1903 ausgegeben.

Martini & Chemnitz, Conchylien Cabinet, Neue Ausgabe.

Lfg. 495. Agnatha, von Kobelt (Decbr. 1904). Enthält den Schluss von Ennea (zusammen 241 sp.) und den Anfang von Edentulina. (Ed. stumpffi nom. nov. für intermedia Kob. nec Morelet p. 294 t. 35 fig. 6, 7; Ed. hamiltoni var. malavensis n. p. 295 t. 36 fig. 21, 22. Zum erstenmal abgebildet Sinoënnea malaccana Mlldff. t. 33a fig. 15, 16; — S. boettgeri Nevill mss t. 33a fig. 17, 18).

— 496. Helix V. (Nanina). Meistens Moellendorff'sche Philippiner; keine n. sp.

— 497. Agnatha, von Kobelt. Bringt die Enneidae zum Abschluss. Keine n. sp.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Lfg. 498. Helix vol. I. 11 V. (Nanina). Keine n. sp.

— 499. Agnatha II. von Kobelt. Enthält den Anfang der Streptaxidae, die wesentlich nach geographischen Gruppen geschieden werden. Die Lieferung bringt die Afrikaner (Gonaxis, Imperturbatia, Priodiscus) und den Anfang der Amerikaner (Streptaxis s. str.).

— 500. Helix-Nanina, von Kobelt. Meistens Inder. Zum erstenmal abgebildet Nanina limbata Mlldff.

— 501. Agnatha von Kobelt. Enthält den Schluss von Artemon, die Happia und Scolodonta und den Anfang von Systrophia.

Wagner, Dr. J. A., Helicinenstudien. — In Denkschr. Akad. Wien Bd. 77. 84 S. mit 9 Tafeln. — Wien, 1905.

Das genaue Studium der Helicinendeckel hat den Verfasser dazu geführt, die alte Gattung Helicina Lam. vollständig zu sprengen. Er unterscheidet drei Unterfamilien der Helicinidae: Apiopomatinae, Pseudotrochatellinae und Heliciminae. Zu den *Apiopomatinae* gehören die drei Gattungen Woldemaria n. für W. japonica, Miluna n. für M. josefinae n. aus China, — und Hendersonia n. für die nordamerikanische Helicina occulta Say. — Die Unterfamilie *Pseudotrochatellinae* umfasst die Gattungen Pseudotrochatella Nevill, Calybium Morelet und Priotrochatella Fischer. — Die *Heliciminae* enthalten die Gattungen Sulfurina Mlldff. mit den Formenkreisen Citrina, Globulina und Kosmetopoma: — Sturanya n., Typus St. plicatilis Mouss.; — Aphanoconia n. mit den Formenkreisen Reticulata, Agasawarana, Skulpta, Trichroa, Dichroa, Andamanica, Fulgora und Discoridea; — Orobophana n. mit den Formenkreisen Sphaeroidea, Primeana, Sublaevigata, Musiva, Diversicolor und Pachystoma; — Hemipoma für drei japanische Arten, — und Palaeohelicina für fischeriana Montr. und Verwandte.

Als neue Arten werden beschrieben: Miluna josefinae, Badung Prov. Hubei in China p. 353 t. 1 fig. 20, 13; — Sulfurina citrina apostasis n. und bicolor n. Luzon p. 572 t. 2 fig. 3; — S. citrinella Mlldff. zuerst abgebildet t. 2 fig. 4; — S. euchromia p. 473 t. 2 fig. 5 a b, mit var. bicincta Mlldff. fig. 6 und apicata Mlldff. fig. 7; — S. sphaeridium Mlldff. t. 2 fig. 10; — S. lawiae n. Halmahera; p. 376 t. 2 fig. 11; — S. parva minima, Katanduanes; p. 377 t. 2 fig. 15; — S. p. globulina, Luzon, p. 377 t. 2 fig. 13; — S. zelebori amphibola, Andamanen, p. 378 t. 3 fig. 4; — S. jickelyi, Britisch Neu-Guinea; p. 379

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

t. 4 fig. 1; — S. sturanyi Aibukit, Palaos; p. 379 t. 2 fig. 6; — Sturanya jetschini n. Samoa, Viti; p. 384 t. 3 fig. 14, 21; — St. carolinarum Mlldff. abgeb. t. 3 fig. 9; — Aphanoconia hainanensis Mlldff. desgl. t. 4 fig. 12; — A. eduardi, Louisiaden, p. 393 t. 4 fig. 17; — A. braueri Woodlark, p. 394 t. 4 fig. 20; — A. submucronata Mlldff. mss. Constantinhafen, Neu-Guinea; p. 400 t. 5 fig. 14; — A. trichroa, Banguei bei Borneo; p. 400 t. 5 fig. 15, 16; — A. tr. candaramanica, Candaramanes; p. 401; — A. tr. calamianica, Busuanga, p. 401 t. 5 fig. 17; — A. dichroa Mlldff. abgeb. t. 6 fig. 1; — A. keiensis, Kei-Inseln; p. 405 t. 9 fig. 8; — A. bandana hombroni, Kleine Kei-Inseln; p. 406; — A. pentheri, Tahiti; p. 408 t. 6 ffg. 13; — A. fulgora diminuta Mouss. abgeb. t. 6 fig. 18 — A. zigzag ponapensis, Ponape. p. 409; — A. suturalis damme-; rensis, | Dammer-Insel; p. 411 t. 6 fig. 15; — A. altivaga Ancey abgeb. t. 7 fig. 3; — A. oceanica Pease desgl. t. 7 fig. 1; — A. discoidea Pease desgl. t. 7 fig. 4; — A. d. tumidior, Tahiti; p. 413 t. 7 fig. 5; faba fig. 6, subrufa fig. 7; — Orobophana colorata raiateae p. 418, Raiatea; — O. media vermiculata, Lifu; p. 424 t. 8 fig. 4; — Palaeohelicina fischeriana phronema, Entrecasteaux-Inseln; p. 436 t. 9 fig. 11; — P. f. lampra. Louisiaden, p. 436; — P. heterochroa, Palaos; p. 436 t. 9 fig. 13, 15; — P. stanleyi [asphaleia, Neu-Pommern; p. 438 t. 9 fig. 18; — P. filiae. Louisiaden; p. 439 t. 9 fig. 19.

Martens, Ed. von, Koreanische Süsswasser-Mollusken. In: Festschrift 80. Geburtstag Prof. Moebius, Suppl. VIII zu den „Zoologischen Jahrbüchern." Jena 1904 p. 23—70. Mit 3 Tafeln, 1 Karte und 3 Abbildungen im Text.

Der Verfasser hat diese seine letzte Arbeit noch vollenden können bis auf die Einleitung, die offenbar eine eingehende Uebersicht über die geographische Verbreitung der koreanischen Mollusken bringen sollte. Der Tod hat ihm die Feder aus der nie rastenden Hand genommen. Das Material ist wesentlich das von Gottschee 1883 & 1884 gesammelte; die neuen Arten sind meistens schon im S. B.-Ges. naturf. Fr. Berlin 1886 veröffentlicht, werden aber hier zum erstenmal abgebildet. Es sind: Melania gottschei t. 1 fig. 1. mit Abbildung der Radula; — M. succincta t. 1, fig. 4; — M. multisculpta n. p. 29 t. 1 fig. 3; — M. forticostà t. 1 fig. 5; — M. tegulata t. 1 fig. 17, 18;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

— M. nodiperda t. 1 fig. 10: var. quinaria fig. 12, var. pertinax fig. 11; var. connectens fig. 2: — M. nodifila n. p. 38 t. 1 fig. 8; — M. graniperda t. 1 fig. 9; — M. coreana p. 40 t. 1 fig. 6, 7; — M. multicincta t. 1 fig. 13; — M. extensa t. 1 fig. 15, 16; — M. paucicincta ti. 1 fig. 46; — M. ovulum t. 2 fig. 3; — M. globus t. 2 fig. 2, mit Abb. der Radula; — Unio coreanus t. 3 fig. 5; — U. gottschei t. 2 fig. 11; — U. acrorhynchus t. 3 fig. 4; — U. douglasiae var. sinuatatus n. p. 57, Textfig.: — U. pliculosus t. 3 fig. 3; — U. verrucifer t. 3 fig. 2; — Anodonta cicaeformis var. flavolincta n. p. 64 t. 2 fig. 4; — Corbicula elatior n. p. 65 t. 2 fig. 5; — C. producta n. p. 66 t. 2 fig. 8; — C. papyracea p. 67 t. 2 fig. 10.

Mac Farland, F. M., a preliminary account on the Doridide of Monterey Bay, California. — From: Pr. Biol. Soc. Washington 1905 vol. XVIII p. 35—54.

Vorläufige Mitteilung über mehrjährige Untersuchungen des Verfassers. Zwanzig Arten, davon 15 n. sp. und 5 n. gen.: Montereyina (n. gen.) nobilis p. 38; — Discodoris heathi p. 39; — Rostanga pulchra p. 40; — Cadlina marginata p. 43; — C. flavomaculata p. 43; — Doriopsis fulva p. 45; — Aegires albopunctulatus p. 45; — Laila (n. gen.) cockerelli p. 47; — Triopha maculata p. 49; — Tr. grandis p. 50; — Polycera atra p. 50; — Acanthodoris hudsoni p. 51; — Ac. brunnea p. 52; — Aneula pacifica p. 53; — Hopkinsia (n. gen.) rosacea p. 54.

The Nautilus, vol. XVIII no. 10.

p. 109. Henderson, J. B., on the Sensitiveness of Snails to Weather Conditions.

p. 110. Dall, W. H., Note on Lucina (Miltha) Childreni Gray, and on a new species from the Gulf of California.

p. 112. Johnson, C. W., Further Notes on the species of Marteeia.

p. 113. Dall, W. H., Notes on some preoccupied names of Molluscs. Für Parmulina wird Parmulophora vorgeschlagen, für Patinella Patinigera.

p. 113. Cockerell, T. D. A., a new Oreohelix (strigosa subsp. metcalfei).

p. 114. Dall, W. H., Names in the Pupillidae.

p. 116. Pilsbry, H. A., the Pupillidae of Risso and Jeffreys.

Kobelt, W. & G. Winter- von Moellendorff, Landmollusken. In C. Semper, Reisen im Archipel der Philippinen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Wissenschaftliche Resultate. — Zehnter Band, erstes Heft. — Wiesbaden 1905.

Die enorme Arbeit, welche Moellendorff an die Philippiner Landconchylien gewendet hat, wird nicht verloren gehen; Kobelt setzt in Verbindung mit der Tochter des Verstorbenen, welche die Herstellung der Tafeln nach einem neuen Lichtdruckverfahren übernommen hat, das Werk fort, in engem Anschluss an das von Moellendorff herausgegebene Verzeichnis, dessen Typen das Senckenbergische Museum in Frankfurt ja sämtlich besitzt. Die vorliegende erste Lieferung enthält auf sieben Tafeln die sämtlichen von Moellendorff unterschiedenen Arten und Unterarten von Obbina C. Semper (richtiger Gallinula Hartm. 1840).

Kobelt, Dr. W., Iconographie der schalentragenden europaeischen Meeresconchylien. Dritter Band, Lfg. 10 & 11 (Schluss). — Mit Taf. 91—98.

Enthält den Schluss der Pleurotomidae, besonders auch die Tiefwasserformen der neuesten Expeditionen (Travailleur etc.) in Kopieen nach Locard und Dautzenberg & H. Fischer. Zum erstenmal abgebildet: Mangelia aurea Brugn. t. 94 fig. 12; — Cordieria reticulata horrida Mtrs. t. 96 fig. 18, 19; — C. hystrix Jan t. 96 fig. 20; — Cyrillia aequalis Jeffr. t. 96 fig. 16, 17; — Bedauerlicher Weise ist bei der Unterschrift zu Taf. 91 beim Druck ein Name ausgefallen; es muss heissen: 9—11. Pleurotoma pyrrhogramma Dautz & Fischer. — 12 Pl. monotropis Dall.

Lindinger, Dr. L., Verzeichnis der in und um Erlangen beobachteten Mollusken. — In: Abh. naturh. Ges. Nürnberg vol. XV Heft 2, Jahresbericht für 1903. Nürnberg 1904 S. 65—83.

Die durchschnittliche deutsche Fauna der Mittelgebirge. Einige biologische Beobachtungen sind beigegeben.

Caziot, Comm., Faunule malacologique quaternaire recent de Nice, Alpes Maritimes. Aus Ann. Soc. Linn. Lyon 1905 Sep., 12 S.

53 Arten, von denen eine Anzahl heute nicht mehr um Nizza vorkommen. Namentlich fehlen alle grössere Arten oder sind doch äusserst selten; so die Leucochroa, die Gruppe der Helix niciensis, der cespitum; von Helix aspersa und vermiculata finden sich nur kleine Formen ganz einzeln.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Bartsch, Paul, a new Ashmunella (townsendi) from New Mexico. — In: Smith. Miscell. Coll. 1904 Nr. 1469 p. 13.

— —, *Notes on the genus Sonorella, with descriptions of new species.* — Ibid. no. 1481 p. 188—200, with pl. XXVIII—XXXIII.

Sämtliche Arten werden aufgezählt, und als neu beschrieben und photographisch abgebildet (oder zum erstenmal abgebildet): indiöensis (Yates), Kalifornien p. 189 t. 33 fig. 1; — ashmuni, Arizona: p. 190 t. 31 fig. 5; — hachitana Dall abgeb. t. 31 fig. 2; — nelsoni n. Chihuahua, Mexiko, p. 191 t. 31 fig. 3; — goldmanni ibid., p. 192 t. 32 fig. 5; — granulatissima Pilsbry t. 31 fig. 1; — mearnsi, Arizona, p. 194 t. 32 fig. 2; — baileyi, Kalifornien, p. 195 t. 33 fig. 4; var. orcutti t. 33 fig. 5; — fisheri, Kalifornien; p. 197 t. 33 fig. 3.

— —, *a new species of Amphidromus* (gossi vom Kinabalu): u. No. 1485 p. 292 t. 46 fig. 1—9.

Proceedings of the Academy of Natural Science of Philadelphia. 1904 vol. 46 no. 3.

p. 616. Pilsbry, H. A. & Y. Hirase, Descriptions of new Land snails of the Japanese Empire. — Neu: Japonia tokunoshimana p. 616; — Alycaeus parvus, tokunoshimanus p. 617; — Al. laevicervix, Pupinella oshimae tokunoshimensis, Cyclotus nudus p. 618; — Cyathopoma jolae p. 619; — Diplommatina tosana, tosanella, gibbera p. 620; — D. goniobasis & var. onoensis, kyushuensis p. 621; — D. tokunoshimana, ventriosa p. 622; — D. kumejimana, lateralis, immersidens p. 623; — D. vespa p. 624; — Helicina verecunda degener p. 615; — Aegista friedeliana humerosa, Aeg. omma p. 625; — Euhadra okinoerabuensis, Eulota callizona montivaga p. 626; — Acusta despecta var. ikuensis, var. praetenius, moyaka p. 627; — Trishoplita nitens, Chloritis obscurus (Textfig.) p. 628; — Chl. tosanus subsp. osumiensis, Ganesella tokunoshimana p. 629; — Gan. myomphala okinoshimana, Gan. selasia textilis & zonata p. 630; — Ennea iwakawa miyakoshimana, Vertigo hirasei glans & okinoerabuensis, Pupa insulivaga p. 631; — Trochomorpha cultrata & var. esuritor, Sitala insignis, S. latissima conica p. 632; — Kaliella kikaigashimae, K. humiliconus, K. okinoshimana, bimaris p. 633; — K. gudei persimilis, Micro-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

cystina vaga, M. lampra p. 634; — Macrochlamys dulcis koshikijimana, M. subelimatus p. 635; — M. gudei inclytus, Zonitoides apertus, Hirasea insignis, Punctum atomus p. 636; — P. rota, Opeas brevispira, O. kyotoënsis p. 637; — O. obesispira p. 638.

p. 809. Pilsbry, H. A., new Clausiliidae of the Japanese empire. X. With pl. 52—57. — Megalophaedusa ducalis subsp. rex p. 809; — M. cymatodes p. 810 t. 54 fig. 29—33; — M. nagashimana p. 810 t. 54 fig. 25—28; — Hemiphaedusa ventriluna p. 811 t. 55 fig. 58—60; — H. ikiensis p. 812 t. 55 fig. 45—51; — H. platydera var. minoensis p. 813; — H. mikawa p. 813 t. 54 fig. 39—41; — H. hosayaka p. 814 t. 55 fig. 61—63; — H. koshikijimana p. 814 t. 55 fig. 53—57; — Tyrannophaedusa aurantiaca sakui p. 815 t. 55 fig. 52; — Nesiophaedusa (n. subg.) okinoerabuensis p. 816 t. 52 fig. 13, 14; — Luchuphaedusa azumai p. 816 t. 52 fig. 9—11; var. degenerata fig. 12; — L. takunoschimana p. 819 t. 52 fig. 4, 5; — Oophaedusa ophidiöon p. 820 t. 52 fig. 1—3; — Stereophaedusa subhickonis p. 811 t. 54 fig. 34—38; var. saucis p. 822; — Hemizaptyx (n. sect.) purissima p. 826 t. 55 fig. 47—49; — H. asperata p. 826 t. 55 fig. 42—44; — H. hyperaptyx p. 827 t. 56 fig. 85—88; — Zaptyx hirasei abgeb. t. 56 fig. 64—67; — Z. kikaiensis t. 56 fig. 68—71; — Z. varissa b. 829 t. 56 fig. 72—75; — Z. hyperoptyx p. 830 t. 56 fig. 76—79; — var. yeronjimana p. 830; — Z. yaeyamensis p. 831 t. 56 fig. 80—84; — Metozaptyx (n. sect.) pattalus p. 832 t. 57 fig. 93—97; subsp. miyakoënsis p. 832; — M. daemonorum t. 57 fig. 98, 99; subsp. viva p. 833 t. 57 fig. 89—92; — Parazaptyx (n. sect.) hedleyi p. 835 t. 57 fig. 105—110; — Diceratoptyx (n. sect.) eladoptyx p. 837 t. 57 fig. 111—115; — Euphaedusa tryoni var. miyakejmiana p. 837.

Eingegangene Zahlungen:

Direktor Dr. Reinhardt, Berlin, Mk. 12.—; Landrat von Heimburg, Biedenkopf, Mk. 30.—; Dr. J. Hofer, Wädenswil, Mk. 12.—; K. G. Gude, London, Mk. 6.—; Professor Spiridion Brusina, Zagreb, Mk. 6.—; Naturhistorisches Museum, Wiesbaden, Mk. 6.—; Löbbecke-Museum, Düsseldorf, Mk. 12.—; Dr. Hermann, Gelsenkirchen, Mk. 6.—; Carlo H. Joos, Stuttgart, Mk. 6.—; Paul Ehrmann, Leipzig, Mk. 6.—; Henrik Sell, Kopenhagen, Mk. 6.—; Pastor Ricklefs, Waddenwarden, Mk. 6.—.

Redigiert von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Ausgegeben: 28. Oktober.